

# Intimo Softcare®

DETERGENTE DELICATO SPECIALE  
UTILIZZABILE ANCHE IN CASO DI IRRITAZIONI ASPECIFICHE



*Per te, con te, ogni giorno...*



L'Intimo Softcare è un detergente intimo speciale, senza profumazione, assolutamente innovativo e primogenito di una nuova famiglia di detergenti «filmogeni» basati sui derivati del glucosio (caprylyl/capryl glucoside, hydroxyethylcellulose), in grado di svolgere una delicata azione detergente e protettiva su cute e mucose.

Vi è un solo tensioattivo, il caprylyl/capryl glucoside, assolutamente non aggressivo e impiegato alla minima dose, caratterizzato da un equilibrato potere detergente anche in acque dure; la camomilla (chamomilla recutita

water) svolge un'azione decongestionante e deodorante, l'elastina marina (hydrolyzed elastin) è protettiva ed eutrofica. La cellulosa (hydroxyethylcellulose) è un derivato del glucosio che, dopo evaporazione dell'acqua, si deposita sulla pelle e sulle mucose, proteggendole con un sottile strato filmogeno.

Pertanto è indicato per la detersione della mucosa ano-genitale sia in soggetti che non tollerano i comuni detergenti intimi, sia per l'igiene intima di neonati, lattanti e bambini.

## CANNABIDILOLO FORMULATO IN OVULI VAGINALI:

la forma farmaceutica innovativa che si trasforma in emulsione estemporanea intravaginale



Rubrica a cura di **Rosalba Lombardo**,  
Product Specialist R&D Formulation - Compounding presso ACEF Galenica



L'atrofia vulvo-vaginale è una condizione caratterizzata da un assottigliamento dell'epitelio vaginale con conseguente ridotta lubrificazione, perdita di elasticità e infiammazione. I sintomi che si possono manifestare comprendono bruciore durante la minzione, prurito intimo, dolore durante i rapporti sessuali, sanguinamento postcoitale e infezioni vaginali ricorrenti. La principale causa che determina l'atrofia vulvo-vaginale è la diminuzione dei livelli di estrogeni ematici, condizione che si manifesta con maggiore frequenza nelle donne in menopausa. Circa il 40-60% delle donne in post menopausa soffre infatti di sintomi urogenitali derivati dall'atrofia vaginale.

### FORMULAZIONE OVULI CANNABIDILOLO

Il Cannabidiolo viene solubilizzato in una base lipofila idrodispersibile, allestita aggiungendo alla base lipofila per ovuli Witepsol H15, un tensioattivo non ionico di tipo O/A. Dopo la somministrazione dell'ovulo, inizia la sua fusione che porta ad una miscelazione con la secrezione idrofila vaginale. Il tensioattivo contenuto crea in questo modo un'emulsione sulla mucosa vaginale. La formulazione rappresenta una forma di transizione verso le preparazioni semisolide, ma ha il vantaggio di essere una forma farmaceutica monodose.

CANNABIDILOLO (CBD) DAC GTDP ACEF	50-100 mg
POLIETILENGLICOLE 400 MONOSTEARATO SC.	60 mg
CERA D'API GIALLA IN GOCCE	90 mg
WITEPSOL H 15	qb a 1 ovulo

### MODUS OPERANDI

Portare a fusione WITEPSOL H 15, POLIETILENGLICOLE 400 MONOSTEARATO SC e CERA D'API GIALLA a bagnomaria, continuando ad agitare lentamente. Triturare/micronizzare CANNABIDILOLO e setacciare successivamente. Levigare con la minima quantità di base lipofila fusa, aggiungere la restante quantità secondo il metodo delle diluizioni progressive e miscelare fino ad ottenere composto omogeneo. Mescolare, lasciar raffreddare (fino ad una viscosità ottimale) e versare negli stampi. Lasciare raffreddare e rimuovere eventuali eccessi.

### PACKAGING

STAMPI IN STRISCE PER 10 OVULI DA g 3 ACEF  
NASTRO PER OVULI.